

d.d. 19/03/2020



**Servizio SC ASSISTENZA FARMACEUTICA**

**Dirigente responsabile del procedimento:**

dott. Stefano Palcic tel. 040 3995978

**E mail:** [assistenza.farmaceutica@asugi.sanita.fvg.it](mailto:assistenza.farmaceutica@asugi.sanita.fvg.it)

Ai Sigg.  
Medici di Medicina Generale

Ai Pediatri di Libera Scelta

Alle Strutture Dipendenti ed Accreditate

**Oggetto:** Precisazioni EMA sull'utilizzo dei FANS -  
emergenza COVID-19

L'EMA è venuta a conoscenza di segnalazioni, in particolare dai social media, che sollevano dubbi su sul fatto che l'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, potrebbe peggiorare la malattia da COVID-19.

**Non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l'ibuprofene o altri FANS e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19.** L'EMA sta monitorando attentamente la situazione e valuterà tutte le nuove informazioni che saranno disponibili su questo problema nel contesto della pandemia. **Attualmente non ci sono ragioni per interrompere il trattamento con ibuprofene o altri FANS.**

L'EMA nel maggio 2019 ha iniziato una revisione dei farmaci antinfiammatori non steroidei ibuprofene e ketoprofene, a seguito di un'indagine che suggeriva che l'infezione dovuta alla varicella e alcune infezioni batteriche potrebbero essere aggravate da questi medicinali. Nelle informazioni sul prodotto di molti medicinali FANS sono già presenti delle avvertenze che gli effetti degli anti-infiammatori non steroidei possono mascherare i sintomi di un peggioramento dell'infezione.

All'inizio del trattamento della febbre o del dolore in corso di malattia da COVID-19 i pazienti e gli operatori sanitari devono considerare tutte le opzioni di trattamento disponibili, incluso il paracetamolo e i FANS.

**Molte linee guida Europee raccomandano il paracetamolo come opzione di primo trattamento nella febbre e nel dolore.**

In accordo alle linee guida nazionali di trattamento, i pazienti e gli operatori sanitari possono continuare a utilizzare FANS (come l'ibuprofene) come riportato nelle informazioni del prodotto approvate.

**Le raccomandazioni attuali prevedono che i FANS vengano utilizzati alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile.**

Nel ricordare che la Scrivente Struttura è a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente  
della Farmaceutica territoriale  
dott. Stefano PALCIC  
*-atto firmato-*

Il Responsabile  
della SC Assistenza Farmaceutica  
dott. Paolo SCHINCARIOL  
*-atto firmato-*