

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ</b>	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati:

**OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:**

Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2. Revisione criteri applicativi.

Alle Aziende ed Enti Sanitari della  
Regione Friuli Venezia Giulia

Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli  
Venezia Giulia

Agli Ordini dei Farmacisti della Regione  
Friuli Venezia Giulia

Ai Medici di Medicina Generale tramite i  
Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Servizio Farmaceutico  
Direzione Centrale Salute FVG

Al Direttore del Servizio sistemi  
informativi e privacy  
Direzione Centrale Salute FVG

Al Direttore del Servizio Assistenza  
ospedaliera e territoriale  
Direzione Centrale Salute FVG

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti sulla precedente comunicazione di data 06 marzo 2021, si aggiornano le indicazioni per la somministrazione dei vaccini contro COVID-19/SARS CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SARS CoV-2.

La Circolare del Ministero della salute del 03 marzo 2021 informa che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di qualsiasi vaccino anti-SARS-CoV-2 ad oggi autorizzato nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Tale indicazione non si applica ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria, in cui, non essendo prevedibile la protezione

immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

Al fine di applicare ai casi pratici della seduta vaccinale la Circolare, si trasmettono le seguenti indicazioni operative concordate con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali:

**Caso A**

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CON DOCUMENTATA INFEZIONE DA SARS CoV-2:

- Si somministra una sola dose, a 3 - 6 mesi dall'inizio della malattia, come da Circolare 3 marzo 2021.
- Se la malattia è documentata a più di 6 mesi dalla vaccinazione, si applica la consueta schedula vaccinale (due dosi).

**Caso B**

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA CONGENITA O ACQUISITA O ULTRAOTTANTENNE  
CON DOCUMENTATA INFEZIONE:

- Somministrazione 1<sup>a</sup> dose subito dopo la negativizzazione del tampone.
- Viene eseguita anche la 2<sup>a</sup> dose secondo la schedula vaccinale.

**Caso C**

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE O CON IMMUNODEFICIENZA CHE SI AMMALA DOPO LA  
PRIMA DOSE DI VACCINO:

- Si procede con la seconda dose secondo la schedula vaccinale se possibile, altrimenti dopo negativizzazione.

Si precisa che l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus non è comunemente raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Dott. Manlio PALEI  
(firmato digitalmente)